



Chalazion

Je bent verwezen voor het laten verwijderen van een chalazion.
We vertellen je graag meer over deze ingreep.

Chalazion

In het onder- en bovenooglid zitten tientallen kliertjes die belangrijk zijn voor de stabiliteit van de traanfilm. Een chalazion is een pijnloze zwelling van een talgklier (kliertje van Meibom) in het ooglid. Doordat de uitvoergang verstopt raakt, kan de talg niet meer naar buiten en ontstaat er een zwelling. Bij een ontsteking kan dit leiden tot lokale roodheid en pijn.

Oorzaak


Meestal is de oorzaak onbekend. Een chalazion komt vaker voor bij patiënten met rosacea (huidaandoening) of chronische ontsteking van de ooglidranden (blepharitis). Het kan ook de nasleep zijn van een acute infectie van een kliertje van Meibom. Een chalazion kan eenmalig voorkomen. Het kan echter ook op dezelfde of andere plaats opnieuw ontstaan.

Behandeling

Een chalazion kan spontaan verdwijnen. Een beginnend chalazion kan behandeld worden met warme kompressen. Leg minimaal tweemaal per dag gedurende 15 minuten een in warm water gedrenkte schone washand of zakdoek op het gezwollen ooglid. Masseer het ooglid tegelijkertijd voorzichtig. Een bijkomende infectie kan met antibioticazalf of ontstekingsremmende druppels behandeld worden.

Chirurgisch verwijderen

Indien het chalazion langere tijd bestaat, kan het onder plaatselijke verdoving door een sneetje in het ooglid verwijderd worden. De ingreep vindt op de onze polikliniek plaats



en duurt ongeveer 15 minuten. Het is van belang om voor de ingreep je contactlenzen uit te doen. Je krijgt druppels om het oogoppervlak te verdoven. De tweede verdoving vindt plaats door een injectie onder de huid te geven nabij het chalazion. Deze injectie kan gevoelig zijn. Het ooglid wordt met een klemmetje naar buiten gedraaid of omgeklapt. De zwelling wordt ingesneden aan de binnenzijde van het ooglid zodat het litteken uitwendig niet zichtbaar is. De inhoud van de zwelling wordt met een klein lepeltje verwijderd. Soms kan een chalazion van het ooglid beter van de huidzijde worden benaderd.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt het oog afgeplakt met een zalfverband welke tot ongeveer twee uur na de ingreep moet blijven zitten. Daarna zijn er geen verdere restricties. Mocht je met de auto komen, dan is het noodzakelijk om iemand mee te nemen. Direct na de behandeling mag je namelijk niet zelf autorijden.

Vragen

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op onze website of neem contact op, bel 088 891 00 40.

Check je dossier op ons Patiëntenportaal

Je kunt met je computer, tablet of mobiel delen van je medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor je hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: spectrumoogziekenhuis.nl/patiëntenportaal.