




Operatie bij glaucoom

Operatie bij glaucoom

Door de oogziekte glaucoom is de druk in je oog hoger dan gezond is voor je oog. Daarom krijg je 2 kleine implantaatjes in je oog. Door de implantaatjes wordt de oogdruk lager. Meestal brengen we de implantaatjes in tijdens een staaroperatie. Hier lees je meer informatie.

Wat is glaucoom


Door oogziekte glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd. Daardoor zie je niet meer alles: je krijgt blinde vlekken in je gezichtsveld. De oogziekte wordt langzaam maar zeker erger. Als we niets doen, kun je uiteindelijk zelfs blind worden.

Veel patiënten met glaucoom hebben een hoge oogdruk. Een hoge oogdruk ontstaat als het oog meer vocht aanmaakt dan afvoert. Micro-invasieve glaucoomchirurgie kan de oogdruk lager maken. Door het lager maken van de oogdruk, kunnen we jouw problemen met zien afremmen.

Wat is minimaal-invasieve glaucoomchirurgie?

Heb je glaucoom of een te hoge oogdruk, en word je aan staar geopereerd?

Dan kunnen we aan het eind van de staaroperatie 2 heel kleine implantaten in je oog aanbrengen. Hiervoor gebruiken we buisjes van titanium, die maar 0,3 mm groot zijn.



Op de illustratie hierboven zie je hoe het implantaatje eruit ziet en waar ze komen in het oog. Dit laat ook zien hoe klein deze implantaatjes eigenlijk zijn. In werkelijkheid zijn ze veel kleiner dan op deze afbeelding: je kunt ze niet zien. Door de implantaatjes kan je oog beter vocht afvoeren. De oogdruk wordt daardoor lager.

We plaatsen de implantaten meestal als je een staaroperatie krijgt. Zo zijn er nauwelijks

toegevoegde risico's ten opzichte van alleen een staaroperatie ondergaan. Vandaar de naam minimaal invasief. De implantaten werken direct als ze in je oog zitten. Wel kan de oogdruk de eerste weken na de operatie nog wisselen. Verder gaat je herstel na de operatie ongeveer hetzelfde als wanneer je alleen een staaroperatie had gehad.

Resultaat van minimaal-invasieve glaucoomchirurgie


- ✓ De implantaatjes zorgen er in veel gevallen voor dat de druk in je oog lager wordt. Het effect op de oogdruk is wel minder groot dan bij zwaardere glaucoomoperaties.
- ✓ Vaak (30% van de gevallen) heb je na de operatie nog steeds oogdruppels nodig om de oogdruk lager te maken. Het kan ook zijn dat je minder vaak of niet meer (70%) hoeft te druppelen voor de oogdruk. Jouw oogarts bespreekt jouw situatie met je op het spreekuur.
- ✓ Je gaat niet beter zien van de implantaatjes. Wel zal het achteruitgaan van je gezichtsveld langzamer gaan door de implantaten.

Risico's en complicaties bij minimaal-invasieve glaucoomchirurgie (MIGS)

De MIGS-operatie is een relatief veilige operatie. Het voordeel is dat het een heel klein implantaat is, dat helemaal binnen het oog zit. Daardoor is er minder kans op problemen na de operatie dan bij grotere operaties bij glaucoom.

Complicaties (onverwachte medische problemen) komen weinig voor bij het plaatsen van de implantaatjes.

Hieronder noemen we complicaties die kunnen gebeuren tijdens en na deze operatie:



- ✓ Soms lukt het niet om de implantaten te plaatsen. Of het lukt maar om er 1 te plaatsen in plaats van 2;
- ✓ Je kunt een kleine bloeding in het oog krijgen na de operatie. Het bloeden stopt meestal snel, maar kan de eerste dagen wat wazig zicht geven of juist een wat hogere oogdruk. Het bloed verdwijnt ook meestal vanzelf weer en de oogdruk wordt dan weer beter;
- ✓ Het probleem wat het meest voorkomt na de operatie, is dat de oogdruk niet genoeg daalt door het plaatsen van de implantaatjes. Het kan zijn dat je dan nog een andere, zwaardere operatie nodig heeft;
- ✓ Heel soms kan een implantaat na de operatie verplaatsen of loslaten. Het kan zijn dat je dan een nieuwe operatie moet krijgen;
- ✓ Je kunt door de operatie een infectie in het oog krijgen. De kans hierop is klein: ongeveer 1 op de 1000 patiënten krijgt een infectie. Soms kan een patiënt met een infectie een oog verliezen. De kans op een infectie na een staaroperatie met minimaal-invasieve-glaucoomchirurgie is vergelijkbaar met de kans op een infectie na alleen een staaroperatie.

MRI-scan

Het implantaatje is gemaakt van metaal (titanium). Het implantaatje is niet magnetisch. Daarom kun je zonder problemen met deze implantaatjes een MRI onderzoek ondergaan, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

Vragen

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op onze website of neem contact op, bel 088 891 00 45.

Check je dossier op ons Patiëntenportaal

Je kunt met je computer, tablet of mobiel delen van je medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor je hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: spectrumoogziekenhuis.nl/patientenportaal.

